



Главный врач МУП ЦМТ
Новиков Ю. О.

» Наврузова 2009 г.

Протокол

Клинических испытаний эффективности лечения аппаратом ДЭТА-ритм.

Задачи исследования:

Определить клиническую эффективность применения аппарата ДЭТА-ритм при патологии щитовидной железы:

- а) в качестве монотерапии;
- б) в составе комплексного лечения.

Место проведения:

МУП «Центр мануальной терапии» г. Уфа

Результаты исследования:

Исследование клинической эффективности прибора ДЭТА-ритм проводилось у 12 пациентов (12 женщин, в возрасте от 24 до 79 лет, средний возраст $\pm 54,6$). Диагноз устанавливался клинически, с подтверждением УЗИ-диагностики и гормонального исследования. Включались пациенты, имеющие большой объем щитовидной железы от 36,8 до 82,6 мм³, пожилой возраст старше 65 лет, наличие узлов больше 2-3 см, наличие тяжелой сердечно-сосудистой патологии, невозможность проведения оперативного вмешательства.

После проведения программы «Щитовидная железа» длительностью 10 минут в течение 6 дней по 1 сеансу в день отмечалось у 2 пациенток с диагнозом «смешанный зоб» увеличение объема щитовидной железы, в первом случае на 2,1 мм, во втором на 5,3 мм, но регистрировалось перераспределение размеров по долям и уменьшение размеров самих узлов с размягчением внутренней структуры. Ушли кисты размером 17*6 мм, образования без капсулы размером 10*6 мм, 9*6 мм. Просматриваются лишь по 2 и 5 мм.

А у пациентки на фоне комплексного лечения с добавлением комбинированного препарата «Йодтирокс» в дозе $\frac{1}{2}$ таблетки утром после шестидневного курса отмечалось уменьшение общего объема на 2 мм и уменьшение в размерах самих узлов.

У пациентки 24 лет с Болезнью Грейвса, находящейся в состоянии неснятого тиреотоксикоза в течение 6 месяцев на фоне комбинированного лечения Мерказолилом в суточной дозе 30 мг после программы «щитовидная железа - гиперфункция» длительностью 5 минут после 4 сеансов отмечалось урежение пульса со 126 уд/мин до 96 уд/мин, уменьшение одышки, дрожи в теле, боли в области сердца.

У всех пациентов улучшились субъективные ощущения, ушло сдавление в области шеи, нормализовался пульс, давление, улучшился сон, качество жизни.

Заключение:

Всем пациентам проводится второй курс лечения. Отмечается более высокая эффективность при комбинированном лечении. Желателен ежедневный прием сеансов с увеличением их кратности (что будет возможно при приобретении приборов в личное пользование), так как из-за загруженности пациентов лечение проводилось с перерывом в 2-3, иногда 5 дней.

Врач-эндокринолог высшей категории



Первушина Вера Юрьевна.